

***Taraxacum officinale* F.H. Wigg. (Asteraceae) no es una especie peruana**

***Taraxacum officinale* F.H. Wigg. (Asteraceae) is not a Peruvian species**

Antonio Galán de Mera

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (Botánica), Universidad San Pablo-CEU, apartado 67, 28660- Boadilla del Monte, Madrid, ESPAÑA. agalmer@ceu.es

Eliana Linares Perea

Universidad Nacional de San Agustín. Sánchez Cerro 219, Manuel Prado, Paucarpata, Arequipa, PERÚ.
elialinper@hotmail.com

Resumen

En el presente trabajo se discute la presencia de *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. en el Perú y se aportan datos sistemáticos y fitogeográficos sobre las secciones *Mexicana* y *Ruderalia*.

Palabras Clave: *Taraxacum*, Perú.

Abstract

In this work the presence of *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. in Peru is discussed, also systematic and phytogeographic data about *Mexicana* and *Ruderalia* sections are presented.

Key Words: *Taraxacum*, Peru.

Introducción

Uno de los aspectos más interesantes de la flora del Perú es su enorme riqueza en especies de la familia de las Compuestas (Brako & Zarucchi, 1993), la cuál aún sigue aportando nuevos táxones. Sin embargo, el género *Taraxacum* F.H. Wigg. es muy poco conocido a pesar del abundante material existente en los herbarios y de las especies descritas en América del Sur y citadas en el país (Doll, 1976; Richards, 1976).

Al abordar la revisión de *Taraxacum* para el proyecto «Flora iberica» (Castroviejo, 1986-2007), hicimos algunas colectas en el Perú con objeto de ampliar nuestros conocimientos sobre el género y estudiar las especies existentes, sus características ecológicas y su distribución.

Las secciones *Ruderalia* y *Mexicana* en el Perú

En el Perú se ha citado *Taraxacum officinale* F.H. Wigg., Prim. Fl. Holsat.: 56 (1780) desde los catálogos florísticos

más antiguos (Herrera, 1941) y, aunque este mismo autor cita además a *T. melanocarpum* Hand.-Mazz., Monogr. Tarax.: 54 (1907)[= *T. gilliesii* Hook. & Arn. in Companion Bot. Mag. 1: 31 (1835), sect. *Antarctica*] ninguna de las dos especies están presentes en el Perú, pues *T. officinale* –con lóbulos foliares simples y manchados de púrpura, lígulas azafranadas y filarias lineares- es ártica y boreal (Brouillet, 2006), y la localidad más septentrional de *T. gilliesii* –plantas pequeñas con las filarias externas oscuras, adpresas con un borde blanquecino o rosado- se encuentra en los Andes de Mendoza, en Argentina (Uhlemann et al. 2004).

Las plantas de América del Sur de la sección *Ruderalia* son adventicias, pues han sido introducidas desde el hemisferio norte (Richards, 1976, Dudman & Richards, 1997). Se caracterizan por ser plantas robustas, con las filarias externas lanceoladas mayores de 8 mm, reflejas, ecallosas y emarginadas; la pirámide

de los aquenios es corta y cónica. La única especie de *Ruderalia* que hemos podido identificar en el Perú es *T. ekmanii* Dahlst. in Ark. Bot. 10(6): 19 (1911), que se diferencia por sus hojas con el lóbulo terminal triangular-hastado, dentado, mayor que los laterales; si las hojas son de dentadas a pinnatífidas éste no se distingue bien (Dudman & Richards, 1997). Sin embargo, en los medios ruderalizados del Perú existen otras especies de esta sección, cuyo origen desconocemos, o quizás se traten de especies nuevas.

La sección *Mexicana* reúne a plantas pequeñas o medianas, con las filarias externas lanceoladas menores de 8 mm, adpresas o recurvadas, ecallosas y casi siempre marginadas, y la pirámide de los aquenios es cónico-cilíndrica y alargada. En el Perú, Richards (1976) reconoce 4 especies: *T. fernandezianum* Dahlst., *T. andiniforme* R. Doll, *T. cuzcense* A.J. Richards, *T. subspathulatum* A.J. Richards. Aunque la caracterización de *T. subspathulatum* y de *T. andiniforme* es dudosa, debido al escaso material de herbario, *T. cuzcense* y *T. fernandezianum* son las dos especies más repartidas por el Perú.

T. cuzcense se distingue por el pecíolo verde o ligeramente rosado y el lóbulo terminal de las hojas sagitado y frecuentemente redondeado; el escapo es de verde a pardo. Se distribuye entre Santiago de Chile y el valle del Urubamba, en el departamento del Cusco, entre los 700 y 3700 m de altitud.

T. fernandezianum presenta el pecíolo purpúreo, muchas veces también el nervio principal de las hojas, que son lanceoladas de dentadas a pinnatisectas; el lóbulo terminal de las hojas es sagitado, agudo y dentado, y el escapo purpúreo (Fig. 1). Es la especie más extendida por los suelos nitrificados de América Central y del Sur (desde Argentina y Chile a las islas Bermuda), entre los 200 y 4120 m de altitud.

Especímenes examinados

Sect. *Ruderalia*

T. ekmanii

PERÚ. **Dpto. Arequipa:** Arequipa, Yanahuara, en borde de acequia, 13-XI-2007, E. Linares & A. Galán 1984 (USP); **Dpto. Arequipa:** Arequipa,

Campus de la Universidad, 20-XI-2007, E. Linares & A. Galán 1985 (USP); **Dpto. Junín:** Huancayo, Jambo, 3000 m, III-1943, J. Soukup 1872 (US 1831636).

T. sp.

PERÚ. **Dpto. Cusco:** Urubamba, dist. Yucay, Huarán, bosque intervenido, 13°14'09"S-72°01'53"W, 3200 m, 19-XII-2002, J. Farfán & A. Tupayachi 423 (K); **Dpto. Cusco:** Abra de la Raya, bofedal, 14°50'04"S-70°59'46"W, 4300 m, 6-IV-2005, C. Aedo 11197 & A. Galán de Mera (MA 728984).

Sect. *Mexicana*

T. cuzcense

PERÚ. **Dpto. Cusco:** Cusco distrit, 11000 ft., X-1933, Miss. D. Stafford (K 323678); **Dpto. Cusco:** Sacsayhuaman ruins, above Cusco, short grassland with a tree synusia covering less than 10%, rocky grassland on hill, 13°32'S-71°57'W, 3577 m, 16-X-1981, S.M. Thomas 2/1 (K 18960); **Dpto. Cusco:** Cusco, 1-IX-1914, Mr. and Mrs. J.N. Rose (US 761629); **Dpto. Cusco:** Urubamba Valley, Hacienda Fancac, 2760 m, 10-IX-1928, E.L. Herrera 2102 (US 1422434); **Dpto. Cusco:** Cusco, 3500-3700 m, III-1925, E.L. Herrera 523 (US 1230231); **Dpto. Puno,** Prov. Puno, Pampa-roadsides, Near shore of Lake Titicaca-Puno, 30-IX-1919, Mrs. R.S. Shepard (US 2195132).

T. fernandezianum

PERÚ. **Dpto. Arequipa:** Arequipa, ruderal, 16°24'39"S-71°32'47"W, 2280 m, 31-III-2005, C. Aedo 10975 & A. Galán de Mera (MA 729417, USM); **Dpto. Arequipa:** Chivay, ruderal, 15°37'58"S-71°36'15"W, 3640 m, 2-IV-2005, C. Aedo 11056 & A. Galán de Mera (MA 729038); **Dpto. Arequipa:** Cotahuasi, fisura en las losas de la calle Centenario 329, ruderal, 9-XI-2007, E. Linares & A. Galán 1986 (USP); **Dpto. Arequipa:** Chacra junto al río Cotahuasi, 9-XI-2007, E. Linares & A. Galán 1987; **Dpto. Cusco:** Machupicchu, borde de camino, 13°09'41"S-72°32'38"W, 2445 m, 8-IV-2005, C. Aedo 11205 & A. Galán de Mera (MA 728475); **Dpto. Huanuco:** Carpish Pass, 84 Km from Tingo María on highway

to Lima, 2750 m, 19-XI-1949, H.A. Allard 21012 (US 1999863); **Dpto. Junín:** Vicinity of Oroya, 10-13000 ft., A.S. Kalenborn (US 1044255); **Dpto. Junín:** pr. Palca, talud con Kagineckia sobre granitos, 11°17'52"S-75°33'22"W, 2550 m, 28-III-2005, C. Aedo 10949 & A. Galán de Mera (MA 729391); **Dpto. Junín:** pr. Tarma, talud sobre calizas, 11°25'19"S-75°43'20"W, 3200 m, 27-III-2005, C. Aedo 10940 & A. Galán de Mera (MA 729382, USM); **Dpto. Junín:** pr. Las Vegas, talud sobre calizas, 11°23'54"S-75°49'11"W, 4070 m, 27-III-2005, C. Aedo 10946 & A. Galán de Mera (MA 728737, USM); **Dpto. Junín:** pr. Junín, cuneta, 11°17'22"S-75°54'49"W, 4120 m, 27-III-2005, C. Aedo & A. Galán de Mera (MA 728710, USM); **Dpto. Lima:** pr. Chuncal, puna junto a un arroyo con *Hordeum muticum*, 11°22'10"S-76°27'36"W, 4050 m, 25-III-2005, C. Aedo 10849 & A. Galán (MA 728446); **Dpto. Lima:** pr. Cullhuay, roquedos calizos, ruderal, 11°24'16"S-76°31'02"W, 3600 m, 25-III-2005, C. Aedo 10870 & A. Galán de Mera (MA 728906); **Dpto. Lima:** pr. Canta, borde de camino, 11°27'40"S-76°36'09"W, 3090 m, 25-III-2005, C. Aedo 10847 & A. Galán de Mera (MA 728448, USM); **Dpto. Lima:** pr. Canta, cuneta húmeda, 11°27'40"S-76°36'09"W, 3070 m, 25-III-2005, C. Aedo 10844 & A. Galán de Mera (MA 728451, USM); **Dpto. Moquegua:** Samegua, sauceda de *Salix humboldtiana*, 17°09'31"S-70°50'07"W, 1700 m, 14-IV-2005, C. Aedo 11354 & A. Galán de Mera (MA 728551); **Dpto. Puno:** pr. Putina, cuneta, 14°50'04"S-70°03'18"W, 3900 m, 5-IV-2005, C. Aedo 11177 & A. Galán de Mera (MA 728964, USM); **Dpto. Puno:** Santa Rosa, ruderal, 13°09'17"S-72°32'02"W, 3935 m, 9-IV-2005, C. Aedo 11222 & A. Galán de Mera (MA 728492, USM).

Agradecimientos

Gracias a los conservadores de los herbarios JE, K, MA, NY, US, USM y USP que pusieron a nuestra disposición su material de *Taraxacum* del Perú; a William Nauray que nos facilitó numerosas fotografías del herbario CUZ.

Literatura citada

- Brako, L. & J.L. Zarucchi. 1993. Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú. Missouri Botanical Garden. St. Louis.
- Brouillet, L. 2006. *Taraxacum* F.H. Wiggers: 239-252 in Flora of North America Editorial Committee. Flora of North America-North of Mexico 19-Magnoliophyta: Asteridae, part. 6: Asteraceae, part. 1. Missouri Botanical Garden. St. Louis.
- Castroviejo, S. 1986-2007. Flora iberica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
- Doll, R. 1976. Eine neue *Taraxacum*-Sippe aus Peru. Feddes Repert. 87(7-8): 447-448.
- Dudman, A.A. & A.J. Richards. 1997. Dandelions of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook N° 9. Botanical Society of the British Isles. London.
- Herrera, F.L. 1941. Sinopsis de la Flora del Cusco. Tomo I. Parte Sistemática. Edición del autor. Lima.
- Richards, A.J. 1976. An account of some neotropical *Taraxacum* species. Rhodora 78: 682-706.
- Uhlemann, I., J. Kirschner & J. Štěpánek. 2004. The Genus *Taraxacum* (Asteraceae) in the Southern Hemisphere. I. The Section Antarctica Handel-Mazzetti and Notes on Dandelions of Australasia. Folia Geobot. 39: 205-220.



Fig. 1. *Taraxacum fernandezianum* A.J. Richards (Cotahuasi, Arequipa, E. Linares & A. Galán 1986, USP)